



# FERTINOX

فرتینوکس ۱۰-۰۴-۴۴


FERTINOX 10-04-44  
+TE  
+ Amino Acid

فرتینوکس ۱۰-۰۴-۴۴  
عناصر ریز مغذی  
غنی شده با اسید آمینه



# 10-04-44

ترکیبی ایده‌آل برای:  
رفع کمبود و تامین عناصر میکرو و ماکرو  
کاملاً محلول در آب  
قابل محلولپاشی و مصرف خاکی



- جذب سریع با کارایی بالا
- حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه
- حاوی عناصر ریزمغذی ضروری
- دارای پتاس بالا



فرتینوکس ۴۴-۰۴-۱۰ کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم بالا به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بر می‌باشد. فرتینوکس ۴۴-۰۴-۱۰ برای درختان میوه و میوه‌های رنگی مانند سیب قرمز، هلو و شلیل و میوه‌های آجیلی مانند پسته، سبزیجات و صیفی مانند گوجه فرنگی طراحی شده است. این محصول حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه بوده که سبب تحریک رشد، افزایش نمو محصولات می‌شود. فرتینوکس ۴۴-۰۴-۱۰ سازگار برای استفاده در خاک‌های شور و قلیایی می‌باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستم‌های آبیاری و محلولپاشی می‌باشد. عناصر ریز مغذی آن به شکل کلات EDTA و حد مجاز عناصر سنگین و آلاینده در آن رعایت شده است. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد می‌باشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ گرد می‌باشند.

### ●●● ریز مغذی‌ها

### ●●● ترکیبات

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)						
اسید آمینه	مولیبدن (Mo)	بر (B)	مس (Cu)	روی (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)	فرتینوکس
۱	۵۰	۶۵۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰-۰۴-۴۴

درصد عناصر			فرتینوکس
پتاسیم (K <sub>2</sub> O)	فسفر (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	ازت (N)	۱۰-۰۴-۴۴
۴۴	۰۴	۱۰	



### نکات قابل توجه

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، رقم گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود و میزان عملکرد متغیر بوده و برای دقت بیشتر آزمون خاک و گیاه توصیه می‌گردد تا حداکثر عملکرد تضمین گردد.
- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با ترکیبات حاوی کلسیم خودداری نمایید، ولی با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری می‌باشد.
- توصیه‌های مصرف: محلول‌پاشی‌ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد. محلول پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب احتمال بروز برگ‌سوزی را افزایش می‌دهد. همچنین به غلظت‌های توصیه شده برای برگ‌پاشی دقت شود. تولید کننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمی‌گیرد.
- انبارداری: فرتینوکس را در بسته‌بندی اصلی، در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- موارد و توصیه‌های ارایه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست‌بوم‌ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه‌های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.

### ●●● توصیه مصرف

محصول	روش مصرف	میزان مصرف	زمان مصرف
گیاهان زراعی	محلولپاشی	۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار	دراواسط دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	قبل از شروع رسیدن
درختان میوه	محلولپاشی	۲ در هزار	یکبار در اواخر فصل رشد
	همراه آبیاری	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	در زمان درشت شدن و رسیدن میوه
سبزیجات برگی	محلولپاشی	۲ در هزار	در اواخر دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار	قبل از نمو هد و رسیدن
سبزیجات میوه ای	محلولپاشی	۲ تا ۳ در هزار	در اواخر دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	در زمان درشت شدن و رسیدن میوه
گیاهان زینتی و چمن	محلولپاشی	۲ در هزار	۲ بار بعد از گلدهی
	همراه آبیاری	۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	اواخر دوره رشد به بعد



**BENIZ TAJHIZ Co.**  
Tel: (+9821) 22468083~5  
www.beniztajhiz.com