



FERTINOX 20-20-20  
+ TE  
Amino Acid


فرتینوکس ۲۰-۲۰-۲۰  
عناصر ریز مغذی  
غنی شده با اسید آمینه



# 20-20-20



ترکیبی ایده‌آل برای:  
رفع کمبود و تامین عناصر میکرو و ماکرو  
کامل محلول در آب  
قابل محلولپاشی و مصرف خاکی



- جذب سریع با اثر بخشی بالا
- حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه
- حاوی عناصر ریز مغذی ضروری
- کود کامل بالانس



فرتینوکس کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بر میباشد. فرتینوکس برای کاهش اثر تنفسهای محیطی و مقاوم سازی گیاه برای رشد مطلوبتر گیاه حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه میباشد که موجب تحریک رشد گیاه شده و سبزینگی را افزایش میدهد.

فرتینوکس از مناسبترین منابع کودی ساخته شده، تا در خاکهای شور و قلیایی بیشترین کارایی را برای گیاه داشته باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستم‌های آبیاری و محلولپاشی میباشد. عناصر ریز مغذی آن به شکل کلات EDTA و عاری از عناصر سنگین و آلاینده میباشد. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد میباشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ گرد میباشند.

### ••• ریز مغذی‌ها

### ••• ترکیبات

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)							فرتینوکس	درصد عناصر		
	اسید آمینه	مولیبدن (Mo)	بر (B)	مس (Cu)	روی (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)		پتاسیم (K <sub>2</sub> O)	فسفر (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	ازت (N)
۱	۵۰	۶۵۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰-۳۰-۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰-۳۰-۲۰



### نکات قابل توجه

#### ••• توصیه مصرف

زمان مصرف	میزان مصرف	روش مصرف	محصول
حداقل ۳ بار در طول فصل رشد	۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار	محلولپاشی	گیاهان زراعی
بعد از سبز شدن، قبل از گلدهی	۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار	همراه آبیاری	
۳ بار در اوایل تا اواسط فصل رشد	۲ در هزار	محلولپاشی	درختان میوه
قبل از گلدهی، پس از ریزش گل، رشد میوه	۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار	همراه آبیاری	
۳ بار در طول فصل رشد	۲ در هزار	محلولپاشی	سبزیجات برگ
هر دو تا سه هفتگه یکبار	۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار	همراه آبیاری	
۳ بار در طول فصل رشد	۲ تا ۳ در هزار	محلولپاشی	سبزیجات میوه ای
۳ برگی، قبل از گلدهی، بعد از گلدهی، نمو میوه	۱۰ تا ۱۵ کیلو در هکتار	همراه آبیاری	
۲ بار در طول فصل رشد	۲ در هزار	محلولپاشی	گیاهان زیستی
بسته به نیاز	۴ تا ۵ کیلو در هکتار	همراه آبیاری	

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، رقم گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود و میزان عملکرد متغیر بوده و برای دقت بیشتر آزمون خاک و گیاه توصیه میگردد تا حد اکثر عملکرد تضمین گردد.

- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با ترکیبات مسی و نیز ترکیبات حاوی کلسیم خودداری نمایید، ولی با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری میباشد.

- توصیه‌های مصرف: محلول پاشی‌ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد. محلول پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب احتمال بروز برگ سوزی را افزایش میدهد. همچنین به غلظت‌های توصیه شده برای برگپاشی دقت شود.

تولید کننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمیگیرد.

- انبار داری: فرتینوکس را در بسته بندی اصلی، در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

موارد و توصیه‌های ارایه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست بوم‌ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه‌های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.



BENIZ TAJHIZ Co.  
Tel: (+9821) 22468083~5  
www.beniztajhiz.com