



وکس

FERTINOX 10-50-10
+ TE
Amino Acid


فرتینوکس ۱۰-۵۰-۱۰
عنصر ریزمغذی
غنی شده با اسید آمینه



10-50-10



ترکیبی ایده‌آل برای:
رفع کمبود عنصر میکرو و ماکرو
کاملاً محلول در آب
قابل محلولپاشی و مصرف خاکی



- جذب سریع با کارایی بالا
- حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه
- حاوی عنصر ریزمغذی

فرتینوکس کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بر می‌باشد. فرتینوکس برای کاهش اثر تنفسهای محیطی و مقاوم سازی گیاه برای رشد مطلوب‌تر گیاه حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه می‌باشد که موجب تحریک رشد گیاه شده و سبزیجات را افزایش می‌دهد. فرتینوکس از مناسب‌ترین منابع کودی ساخته شده تا در خاکهای شور و قلیایی بیشترین کارایی را برای گیاه داشته باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستمهای آبیاری و محلولپاشی می‌باشد. عناصر ریز مغذی آن به شکل کلات EDTA و حد مجاز عناصر سنگین و آلاینده در آن رعایت شده است. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد می‌باشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ گرد می‌باشند.

● ریز مغذی‌ها

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)							فرتینوکس
	اسید آمینه (Mo)	مولیبدن (B)	بر (Cu)	مس (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)	روی (Fe)	
۱	۵۰	۶۵۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰-۵۰-۱۰	

● ترکیبات

درصد عناصر	فرتینوکس			
	پتاسیم (K ₂ O)	فسفر (P ₂ O ₅)	ازت (N)	۱۰-۵۰-۱۰
۱۰	۵۰	۱۰	۱۰-۵۰-۱۰	



● توصیه مصرف

محصول	روش مصرف	میزان مصرف (لیتر در هزار لیتر آب)	زمان مصرف
گیاهان زراعی	محلولپاشی	۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار	در اوایل دوره رشد تا سه بار
گیاهان زراعی	همراه آبیاری	۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم در هکتار	بعد از سبز شدن، قبل از گلدهی
درختان میوه	محلولپاشی	۲ در هزار	۳ بار در اوایل تا اواسط فصل رشد
درختان میوه	همراه آبیاری	۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار	قبل از گلدهی و پس از برداشت
سبزیجات برگی	محلولپاشی	۲ در هزار	در اوایل دوره رشد تا سه بار
سبزیجات برگی	همراه آبیاری	۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار	هر دو تا سه هفته یکبار تا قبل از تشکیل هد
سبزیجات میوه ای	محلولپاشی	۲ تا ۳ در هزار	در اوایل دوره رشد تا سه بار
سبزیجات میوه ای	همراه آبیاری	۱۰ تا ۱۵ کیلو در هکتار	۳ برگی، قبل از گلدهی، بعد از گلدهی
گیاهان زیستی و چمن	محلولپاشی	۲ در هزار	۲ بار در اوایل فصل رشد
گیاهان زیستی و چمن	همراه آبیاری	۴ تا ۵ کیلو در هکتار	اوایل دوره رشد

نکات قابل توجه

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، رقم گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود و میزان عملکرد متغیر بوده و برای دقت بیشتر آزمون خاک و گیاه توصیه می‌گردد تا حداقل عملکرد تضمین گردد.
- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با ترکیبات مسی و نیز ترکیبات حاوی کلسیم خود داری نمایید، ولی با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری می‌باشد.
- توصیه‌های مصرف: محلول پاشی‌ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد. محلول‌پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب احتمال بروز برگ‌سوزی را افزایش می‌دهد. همچنین به غلظت‌های توصیه شده برای برگ‌پاشی دقت شود.
- تولید کننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمی‌گیرد.
- انبار داری: فرتینوکس را در بسته بندی اصلی، در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- موارد و توصیه‌های ارایه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست‌بوم‌ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه‌های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.



BENIZ TAJHIZ Co.
Tel: (+9821) 22468083~5
www.benitzajhiz.com